

Постоянно принимаемые препараты утром пьются в обычной дозировке.

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ, РЕКТОСКОПИИ.

В случае хронических запоров за три дня до исследования придерживаться диеты, исключающей: бобовые, мучные продукты, цельное молоко. Возможен прием следующих слабительных: гутталакс, форлакс. Не рекомендуется приём препаратов сены, ягод, активированного угля, препаратов железа.

1. Вечером накануне осмотра сделать две клизмы каждая объемом 2,5 литра. Первая клизма в 18.00, вторая - в 20.00. Для клизм использовать воду комнатной температуры. Утром в день осмотра так же сделать две-три клизмы по 2,5 литра каждая. Последняя клизма не позднее 1,5 часов до начала осмотра.
2. Три пакета фортранса растворить в 3 литрах кипяченной воды. (Дозировка зависит от склонности к запорам и веса пациента: свыше 70 кг принимать не менее 4 литров). Принимать по 1 литру раствора в час (1 стакан за 15 мин) вечером накануне осмотра с 14.00 до 17.00.

Прийти _____ 225каб. ПОЛОТЕНЦЕ, ПРОСТЫНЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ (ирригоскопия, КТ).

На **БРОНХОСКОПИЮ**: нормализация АД,

отсутствие аллергии на лидокаин, атропин, димедрол.

Прийти натощак, взять с собою полотенце, описание рентген снимков, результаты КТ, ингалятор пациентам, которые пользуются.

Кабинет 221.

На **ФГДС**: прийти натощак, взять с собою полотенце.

Кабинет 229.
